

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE STRASBOURG (Tél. 34-14-63  
Poste 93)

ABONNEMENT ANNUEL  
15 F.

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MOSELLE, VOSGES)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux : Cité Administrative, 2, Rue de l'Hôpital Militaire  
STRASBOURG

C. C. P. : STRASBOURG 55-08-86

3 Juin 1964.

Bulletin n° 45 du mois de Juin 1964.

## ARBRES FRUITIERS

### /Avertissement/

#### TAVELURES DU POMMIER ET DU POIRIER

La protection fongicide vis-à-vis des Tavelures doit être maintenue d'une façon efficace. Un nouveau traitement devra être réalisé dès réception du présent avis.

En cas de fortes précipitations (pluies orageuses abondantes par exemple), renouveler la protection sans attendre un avis de la Station.

#### CARPOCAPSE

Le temps chaud qui s'est installé sur nos régions a favorisé une activité relativement précoce du Carpocapse. Les premières attaques de Chenilles sur fruits pourront se produire d'ici quelques jours.

Un traitement insecticide réalisé avant le 9 Juin, devrait permettre d'assurer une protection contre ces premières attaques qui ne sont pas à négliger, compte tenu de la fructification moyenne de certaines variétés.

Pour le choix des produits à utiliser, consulter la liste en votre possession.

### /Information/

#### OIDIUM

L'Oïdium est toujours en progression, notamment dans les vergers insuffisamment protégés. Poursuivre les traitements et, dans la mesure du possible, enlever les pousses oïdiées.

188  
DLP -9-6-64 305900

### MOUCHE DE LA CERISE

Sur les variétés sujettes aux attaques de la Mouche de la cerise, notamment les variétés tardives, un traitement préventif devrait être réalisé dès réception, dans les vergers situés en plaine.

On utilisera l'un des produits suivants :

- |              |   |         |                    |             |
|--------------|---|---------|--------------------|-------------|
| - D.D.T.     | : | 125 gr. | de matière active/ | hectolitre. |
| - Dimethoate | : | 30 gr.  | "                  | "           |
| - Parathion  | : | 25 gr.  | "                  | "           |
| - Fenthion   | : | 50 gr.  | "                  | "           |
| - Diazinon   | : | 20 gr.  | "                  | "           |

Dans les vergers en altitude, cette intervention pourrait être retardée de 8 à 12 jours selon les situations.

La protection parfaite des fruits, nécessite 2 applications à dix jours d'intervalle.

Nous rappelons que l'emploi des produits à base de D.D.T. , de Parathion, de Fenthion et de Diazinon est interdit pendant les quinze jours qui précèdent la récolte.

Cette interdiction est de 7 jours pour les produits à base de Diméthoate.

### V I G N E

#### MILDIOU DE LA VIGNE

Le traitement fongicide conseillé dans notre note du 29 mai, doit être étendu à l'ensemble du vignoble.

#### GRANDE CULTURE

##### - HOUBLON -

#### MILDIOU DU HOUBLON

Bien que l'état sanitaire des cultures soit en général satisfaisant, il y a lieu de renouveler la protection fongicide pour assurer une protection parfaite de la végétation.

On opérera dans la période du 5 au 7 Juin.

#### POMMES DE TERRE

#### DORYPHORE

Les pontes sont nombreuses et dans certaines situations il a été noté les premières éclosions. Surveiller attentivement les cultures de façon à pouvoir effectuer un traitement insecticide aussitôt que les larves atteindront la grosseur d'un grain de blé.

Utiliser l'un des produits conseillés sur la liste spéciale.

Les Contrôleurs :  
J. BERNARD et C. GACHON.

l'Inspecteur :  
J. HARRANGER.

Imprimerie de la Station de STRASBOURG/Directeur-Gérant : L. BOUYX.